

Problemas de Cálculo na OBM-U

Ricardo T. Bortolotti

July 31, 2017

1 Sequências e Séries

Problema 1 (OBM-U 2016 - Problema 1, 2a fase). *Seja $\{a_n\}$ uma sequência de números reais tal que $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$ converge. Prove que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = 0.$$

Idéia: Um truque interessante para esse problema é utilizar a fórmula de soma por partes:

$$\sum_{k=m}^n a_k(b_{k+1} - b_k) = [a_n b_n - a_m b_m] - \sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k)b_{k+1}.$$

Inspirados na analogia da fórmula acima com a integração por partes, formulamos um enunciado análogo para funções:

Problema Relacionado. *Seja $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que a integral imprópria $\int_1^\infty \frac{f(x)}{x} dx$ é convergente. Prove que*

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1}{y} \int_1^y f(x) dx = 0.$$

1.1 Convergência de séries

Problema 2 (OBM-U 2002 - Problema 5, 2a fase). *Dados $x \in \mathbb{R}$, definimos $\ln_0(x) = x$ e, para cada $k \in \mathbb{N}$, se $\ln_k(x) > 0$, definimos $\ln_{k+1}(x) = \ln(\ln_k(x))$, onde \ln é o logaritmo natural.*

Dado n inteiro positivo, definimos $k(n)$ como o maior k tal que $\ln_k(n) \geq 1$, e $a_n = \prod_{j=0}^{k(n)} \ln_j(n) = n \ln n (\ln \ln n) \cdots \ln_{k(n)}(n)$.

Diga se a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ converge ou diverge.

Idéia: Nos cursos de Cálculo, é explicado como usar o teste da integral para verificar que as séries $\sum \frac{1}{n \ln n}, \sum \frac{1}{n \ln n \ln n}, \sum \frac{1}{n \ln n \ln \ln n \ln n}, \dots$ são divergentes. Adapte essa idéia.

Curiosamente, o mesmo problema veio a aparecer na Putnam de 2008.

Problema Relacionado (Putnam 2008 - Problema A4). Defina $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = x$ se $x \leq e$ e $f(x) = xf(\ln x)$ se $x > e$. Determine se a série $\sum \frac{1}{f(n)}$ é convergente ou divergente.

Para os próximos 2 problemas, a solução passa por comparar as séries com outra do tipo $\sum \frac{1}{n^p}$.

Problema 3 (OBM-U 2012 - Problema 6, 1a fase). Considere a parábola formada pelos pontos (x, x^2) , $x \in \mathbb{R}$, e a sequência $x_n = n^\alpha$, onde $\alpha > 0$ é uma constante real. Considere a região formada pelos pontos (x, y) com $x > 0$ e que se situam abaixo da parábola e acima das retas tangentes à parábola nos pontos (x_n, x_n^2) , $n \geq 0$. Para que valores de α essa região tem área infinita?

Idéia: A área descrita corresponde a uma série infinita. A idéia é comparar a série com outra do tipo $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Problema 4 (OBM-U 2005 - Problema 4, 2a fase). Considere a sequência (a_n) dada por $a_1 = 1$ e

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n^{2005}}$$

para todo $n \geq 1$. Prove que a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{na_n}$ converge.

Idéia: Tome um inteiro k para o qual é possível comparar $a_{n+1}^k = (a_n + \frac{1}{a_n^{2005}})^k$ com n .

Outro interessante problema da OBM-U sobre convergência de séries.

Problema 5 (OBM-U 2006 - Problema 5, 2a fase). Seja $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ uma função crescente e bijetora. Prove que a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$ converge se, e somente se, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{-1}(n)}{n^2}$ converge, sendo f^{-1} a função inversa de f .

1.2 Sequências recorrentes

Uma recorrência interessante é dada pela relação $a_{n+1} = a_n^2 - 2$. Nesse caso, o termo geral é da forma $a_n = \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n}$ para algum $\alpha \in \mathbb{C}$ encontrado através do a_1 .

Problema 6 (OBMU 2003 - Problema 6, 1a fase). Defina $a_1 = 3$ e $a_{n+1} = a_n^2 - 2$. Prove que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln a_n}{n} = \ln 2$ e calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln \ln a_n - n \ln 2)$.

Essa recorrência já esteve presente em um problema da Putnam e em outro da IMC.

Problema Relacionado (Putnam 2014 - Problema A3). Sejam $a_0 = \frac{5}{2}$ e $a_{k+1} = a_k^2 - 2$ para todo $k \geq 1$. Calcule

$$\prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{a_k}\right).$$

Problema Relacionado (IMC-2010). Defina a sequência x_1, x_2, \dots por $x_1 = \sqrt{5}$ e $x_{n+1} = x_n^2 - 2$ para cada $n \geq 1$. Calcule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_{n+1}}.$$

1.3 Séries de Potências

Uma maneira de se calcular o valor explícito de uma série é através de série de potências quando sabemos qual função a série representa.

Problema 7 (OBM-U 2004 - Problema 6, 1a fase). *Calcule*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(3k+1)(3k+2)(3k+3)}.$$

Idéia: Considere $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{3k+3}}{(3k+1)(3k+2)(3k+3)}$ e derive três vezes.

Problema Relacionado (IMC-2010). *Calcule*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)}.$$

Outro tipo de problema no qual é pedido o valor de uma série e as séries de potência vêm em nosso auxílio:

Problema 8 (OBM-U 2009 - Problema 6, 1a fase). *Considere a sequência a_0, a_1, \dots definida por $a_0 = 0$, $a_1 = \frac{\pi}{3}$ e, para $n \geq 1$,*

$$a_{n+1} = \frac{\pi(a_0a_n + a_1a_{n-1} + a_2a_{n-2} + \dots + a_na_0)}{3(n+1)}$$

Calcule

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{2^k} = a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{4} + \frac{a_3}{8} + \dots$$

Idéia: Considere $f(x) = \sum a_n x^n$ e olhe para $f(x)^2$.

Problema Relacionado (IMC-2003). *Considere a sequência $\{a_n\}$ definida por $a_0 = 1$ e*

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{n-k+2}.$$

Calcule

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}.$$

2 Derivadas

Problema 9 (OBM-U 2006 - Problema 3, 1a fase). *Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ duas vezes diferenciável com $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ e $1 + f(x) = \frac{1}{f''(x)}$ para todo $x \in [0, 1]$, mostre que $f(1) < \frac{3}{2}$.*

Problema 10 (OBM-U 2008 - Problema 1, 2a fase). *Seja $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = \frac{x^{2008}}{2008} + x^2 - nx$, para cada $n \in \mathbb{N}$, e seja m_n o valor mínimo assumido por f_n . Determine $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que o limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n}{n^\alpha}$ existe e é não-nulo, e calcule esse limite (para esse valor de α).*

Problema 11 (OBMU-2012 - Problema 5, 2a fase). *Seja $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ uma função duas vezes derivável satisfazendo $f'(x) < 0$ para todo $x > 0$. Para cada $x > 0$ considere o triângulo cujos lados são a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x, f(x))$ e os dois eixos coordenados. Sabemos que a área deste triângulo é igual a C (constante e independente de x).*

Determine os possíveis valores de $f(1)$.

Problema 12 (OBM-U 2016 - Problema 6, 2a fase). *Dados $C, D > 0$, dizemos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é bonita se f é de classe C^2 , $|x^3 f(x)| \leq C$ e $|x f''(x)| \leq D$ para todo x com $|x| \geq 1$.*

a) *Prove que se f é uma função bonita então, dado $\epsilon > 0$, existe $x_0 > 0$ tal que, para $|x| \geq x_0$, $|x^2 f'(x)| < \sqrt{2CD} + \epsilon$.*

b) *Prove que, se $0 < E < \sqrt{2CD}$, então existe uma função bonita $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para todo $x_0 > 0$, existe $x > x_0$ com $|x^2 f'(x)| > E$.*

2.1 Teorema do Valor Médio e Teorema do Valor Intermediário

Problema 13 (OBM-U 2009 - Problema 1, 2a fase). *Seja $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ crescente, derivável e inversível.*

Se $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f^{-1}(x)dx$, prove que existem dois reais diferentes a e b , $0 \leq a < b \leq 1$, tais que $f'(a) = f'(b) = 1$.

Problema 14 (OBM-U 2007 - Problema 1, 2a fase). *Considere a função f de \mathbb{R} em \mathbb{R} dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $ac < 0$. Prove que, para todo inteiro positivo n , a equação $f(f(\cdots(f(x)))) = 0$ tem pelo menos uma solução real (onde f é composta n vezes com ela mesma).*

3 Integrais

Problema 15 (OBM-U 2010 - Problema 1, 2a fase). *Calcule:*

$$\int_0^{\pi/4} \frac{x}{(\sin x + \cos x) \cos x} dx.$$

Problema 16 (OBM-U 2001 - Problema 5, 2a fase). *Para todo $u \in \mathbb{R}$, seja*

$$I(u) = \int_0^\pi \ln(1 - 2u \cos x + u^2) dx.$$

- a) *Prove que $I(u) = I(-u) = \frac{1}{2}I(u^2)$.*
- b) *Calcule $I(u)$ para todo $u \in \mathbb{R}$.*

Problema 17 (OBM-U 2005 - Problema 5, 2a fase). *Prove que:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} = \int_0^1 x^{-x} dx.$$

3.1 Simetria

Uma idéia particularmente interessante é fazer a mudança de variáveis $u = -x$, esta é especialmente útil quando não sabemos integral $f(x)$ mas sabemos integrar $f(x) + f(-x)$. Utilizando essa idéia, calcule as seguintes integrais.

Problema 18 (OBM-U 2006 - Problema 1, 1a fase). *Calcule a integral: $\int_{-1}^1 \frac{e^x - x - 1}{(e^x - 1)x} dx$.*

Problema 19 (OBM-U 2005 - Problema 2, 1a fase). *Calcule: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \operatorname{tg} x) dx$.*

Problema 20 (OBM-U 2002 - Problema 3, 1a fase). *Calcule $\int_{-1}^1 \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x - 1}{\sqrt{x^2 + 1} + x + 1} dx$.*

Problema 21 (OBM-U 2004 - Problema 2, 1a fase). *Calcule $\int_{-1}^1 \frac{x^{2004}}{1 + e^x} dx$.*

Problema Relacionado (Putnam 2005 - A5). *Calcule $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx$.*

Problema Relacionado (IMC-1996). *Calcule a integral $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(nx)}{(1 + 2^x) \sin x} dx$.*